



灌腸造影檢查



放射診斷部

甚麼是灌腸造影檢查?

是把造影劑由肛門引入大腸，從而產生腸臟的影像，用以檢查大腸的狀況。

一般的X光檢查不能照出大腸嗎?

一般的X光檢查只能顯示出大腸的輪廓，但灌腸造影檢查就能清楚地照出大腸的內壁。

什麼情形下需要做灌腸造影檢查?

灌腸造影檢查是按病人的病徵由醫生轉介而進行的。病徵通常是大便出血、大便習慣改變、腹部痛楚等。

爲什麼在檢查前須吃少渣滓的食物及輕瀉?

- 用意是盡量減少食物渣滓留在腸道內，及清除在腸道內的糞便，以免影響檢查結果。
- 檢查前兩天須禁止吃高纖維的食物如蔬菜、生果、麥皮等。
- 檢查前一晚要服食輕瀉劑，及後切忌飲食。

檢查進行時會有痛楚嗎?

檢查時，醫生會用造影劑及空氣灌漲腸道，可能會引起腹部漲痛。輕微不適，如廁後便會減退。

檢查後有什麼須知?

在檢查後數天內，大便可能會呈現白色及可能會便秘，檢查後須飲大量開水，可吃任何食物。

什麼情況下不能做灌腸造影檢查?

- 懷孕
- 檢查前7天內曾抽取腸組織

除灌腸造影外，還有什麼檢查可幫助確定病因?

- 內視鏡
- 電腦掃描仿真大腸內視鏡